


LA MIXOMATOSIS EN LIEBRES

UNA SERIA AMENAZA PARA NUESTRAS POBLACIONES DE LIEBRES



La Mixomatosis es una Enfermedad de Declaración Obligatoria que afecta a conejos y liebres. No causa problemas a la salud de las personas.



Se transmite de manera directa, a través del contacto con liebres enfermas, y por vía indirecta por medio de artrópodos hematófagos.



Existen vacunas frente al virus ampliamente utilizadas en conejos. En la actualidad se estudia su eficacia sobre liebres.

PARA CONTRIBUIR A EVITAR SU PROPAGACIÓN TENEMOS QUE EXTREMAR LA VIGILANCIA Y TOMAR PRECAUCIONES

SI ENCUENTRO UNA LIEBRE MUERTA O ENFERMA:

Si la liebre aparece muerta en extrañas circunstancias o enferma comunícalo a la espera de que algún Servicio Oficial pueda tomar las muestras oportunas.

Si ningún Servicio Oficial puede tomar muestras a la liebre encontrada muerta (no en estado de putrefacción) o enferma con síntomas compatibles con la mixomatosis, te recomendamos seguir el siguiente protocolo:

- No toques directamente al animal sin guantes ante la posibilidad de que el ejemplar pueda tener tularemia, ya que se trata de una zoonosis.
- Recoge la liebre entera empleando unos guantes e introdúcela en una bolsa cerrándola fuertemente para a continuación meterla en una segunda bolsa.
- Mantén refrigerada la muestra (2-8°C) hasta su envío o recogida en un plazo máximo de 24 horas.
- Si transcurren más de 24 horas, debes congelar la liebre.
- Anota el lugar y día en el que se recoge la liebre junto con un teléfono de contacto, fijando dichas anotaciones a la bolsa para su posterior identificación.

RECOMENDACIONES

Evita repoblaciones, sueltas o traslocaciones de conejos o liebres en tu espacio cinegético, en cualquier caso, cumple el RD 1082/2009.

Cazadores, ganaderos, agentes medioambientales, guardas rurales y demás personas que realicéis actividades en el campo debéis notificar cualquier sospecha de mortalidad anormal o presencia de síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad en las liebres.

Si aparece alguna liebre afectada por la mixomatosis en tu espacio cinegético o en otros próximos, debes valorar la necesidad de suspender la actividad cinegética sobre esta especie.

¿A QUIÉN COMUNICAR?

Servicios veterinarios oficiales, agentes medioambientales, SEPRONA o guardas rurales.

¿CÓMO?

En persona o por teléfono a través del 112 o de los sistemas que tengan establecidos las distintas CCAA.

No te olvides de anotar y comunicar la localización